















La forma de administrar la cantidad correcta de DIFENHIDRAMINA (también conocida por el nombre de marca Benadryl) depende de qué difenhidramina planea dar.

Dosis: Administre cada 6 horas según lo necesite. **NO DAR MÁS DE 4 DOSIS EN 24 HORAS.**
NO USE con cualquier otro medicamento que contenga difenhidramina.

Peso →	20 a 24 libras (entre 9 y 10 kilos)	25 a 37 libras (entre 11 y 16 kilos)	38 a 49 libras (entre 17 y 22 kilos)	50 a 99 libras (entre 23 y 45 kilos)	100 libras o más (más de 46 kilos)
Difenhidramina líquida para niños (12.5 mg / 5 ml)	4 ml 	5 ml → 	← 7.5 ml 	10 ml → 	—
Difenhidramina masticable para niños (12.5 mg)	—	1 tableta 	1 ½ tabletas 	2 tabletas 	4 tabletas 
Tabletas de difenhidramina (25 mg)	—	½ tableta 	½ tableta 	1 tableta 	2 tabletas 
Cápsulas de difenhidramina (25 mg)	—	—	—	1 cápsula 	2 cápsulas 

No administre a niños menores de 2 años.
No administre a niños de entre 2 y 6 años a menos que se lo indique el médico.