
























La forma de administrar la cantidad correcta de IBUPROFENO (también conocido por los nombres de marcas Motrin o Advil) depende de qué ibuprofeno planea dar.

Dosis: para fiebre o dolor, administre cada 6 horas según lo necesite. **NO DAR MÁS DE 4 DOSIS EN 24 HORAS.**
NO USE con otro medicamento que contenga ibuprofeno.

Peso	Edad	Ibuprofeno en gotas para bebé (50 mg / 1.25 ml)	Ibuprofeno líquido para niños (100 mg / 5 ml)	Tabletas masticables de ibuprofeno para niños (100 mg)	Tabletas de ibuprofeno para adultos (200 mg)
0 a 11 libras (hasta 5 kilos)	0 a 5 meses	—	—	—	—
12 a 17 libras (entre 6 y 7 kilos)	6 a 11 meses	1.25 ml 	2.5 ml 	—	—
18 a 23 libras (entre 8 y 10 kilos)	12 a 23 meses	1.875 ml 	4 ml 	—	—
24 a 35 libras (entre 11 y 15 kilos)	2 a 3 años	2.5 ml 	5 ml → 	1 tableta 	—
36 a 47 libras (entre 16 y 21 kilos)	4 a 5 años	3.75 ml 	← 7.5 ml 	1 ½ tabletas 	—
48 a 59 libras (entre 22 y 26 kilos)	6 a 8 años	5 ml 	10 ml → 	2 tabletas 	1 tableta 
60 a 71 libras (entre 27 y 32 kilos)	9 a 10 años	—	← 12.5 ml 	2 ½ tabletas 	1 tableta 
72 a 95 libras (entre 33 y 43 kilos)	11 años	—	15 ml → 	3 tabletas 	1 ½ tabletas 
96 libras o más (más de 44 kilos)	12 años o más	—	10 ml + 10 ml = 20 ml 10 ml →  y 10 ml → 	4 tabletas 	2 tabletas 



healthychildren.org en Español

Desarrollado por pediatras. Respaldado por los padres.
de la American Academy of Pediatrics